

GUIDE DE PLANTATION DU CACAO

Nord et Centre du Bénin

 **Zone cible** : Régions Nord et Centre du Bénin — Privilégier zones humides et bas-fonds

 **À retenir** : Le cacao ne supporte pas le soleil direct, surtout au jeune stade. L'ombrage est OBLIGATOIRE.

1 Choix du site

► Zones favorables

- Zones humides ou proches d'un bas-fond
- Sol profond, fertile et bien drainé (pas d'eau stagnante)

► Zones à éviter

- Zones très sèches et exposées
- Sols sableux pauvres

2 Préparation du terrain

- Défricher sans brûler pour conserver la matière organique
- Faire un léger labour si possible
- Installer les arbres d'ombrage avant ou pendant la plantation

Espèces recommandées : bananier, acacia, anacardier

3 Production des plants (Pépinière)

- Utiliser des graines de bonne qualité
- Semer dans des sachets remplis de terre riche + compost
- Arroser régulièrement et protéger du soleil direct
- Durée en pépinière : 3 à 4 mois
- Plants prêts au repiquage à partir de 4 à 5 feuilles

4 Période de plantation

 **Meilleure période :** Début de saison des pluies — Avril à Juin

5 Mise en place de la plantation

► Écartement et trou de plantation

Paramètre	Valeur
Écartement	3 m × 3 m
Profondeur du trou	60 cm
Diamètre du trou	60 cm

► Étapes de plantation

- Mélanger la terre du trou avec compost ou fumier
- Retirer le sachet sans casser la motte de terre
- Planter droit et tasser légèrement la terre
- Arroser immédiatement après la mise en place

6 Ombrage — OBLIGATOIRE

 **Attention :** Le cacao ne supporte pas le soleil direct, surtout au jeune stade. L'ombrage est une condition de survie.

► Espèces recommandées

- Manioc, Bananier — ombrage rapide pour protéger le jeune plant
- Anacardier, Acacia — ombrage durable pour le long terme

7 Entretien après plantation

► Arrosage — Guide par stade

Stade	Quantité/plant	Fréquence
Jeune plant	1–2 litres	Tous les 2–3 jours
Croissance	3–5 litres	2×/semaine
Adulte (>5 ans)	10–20 litres	1×/semaine

 **Bonnes pratiques** : Arroser au pied, matin ou soir. Sol humide sans excès. Utiliser le paillage. Réduire en saison des pluies.

► **Désherbage et taille**

- Désherbage : 2 à 4 fois par an, éviter la concurrence des mauvaises herbes
- Taille : supprimer les branches mortes ou malades

8 Fertilisation

- Apporter du compost et du fumier organique
- Compléter avec engrais minéral si nécessaire

9 Protection phytosanitaire

Type	Problème principal	Prévention principale
Insectes	Surveillance régulière	Plantation propre et aérée
Maladie	Pourriture des cabosses	Entretien régulier

10 Début de production

Premières cabosses	1 à 2 ans après plantation
Production optimale	Après 5 ans de plantation

11 Conseils clés pour le Nord et Centre

- ✓ Toujours planter avec ombrage — condition non négociable
- ✓ Choisir les zones humides ou proches d'un bas-fond
- ✓ Utiliser le paillage pour conserver l'humidité du sol
- ✓ Prévoir un arrosage régulier en saison sèche

— *Bonne récolte !* —